

## TABLEAU DES VISITES

<b>VISITES</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Semaines</b>	<b>J1</b>	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>S3</b>	<b>S4</b>	<b>S6</b>	<b>S8</b>	<b>S12</b>	<b>S16</b>	<b>S20</b>	<b>S24</b>	<b>S52</b>
Consentement	X											
Inclusion/non inclusion	X											
PBR	X											
Randomisation	X											
Observation	X											
Examen clinique, constantes (Poids, TA, Pouls, température)	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
Bilan Exhaustif (BE) cf annexe 1	X											
Bilan Partiel (BP) cf annexe 2			BP si BU > ou = +		X	BP si BU > ou = +	X	BP si BU > ou = +			X	X
NFS (gr 2)		X	X	X					X			
Test grossesse	X											
Dispensation du ME*	X				X		X	X	X	X		
Médicaments associés	X		X		X	X	X	X	X	X	X	
Effets secondaires du Myfortic			X		X	X	X	X	X	X	X	
Effets secondaires de la corticothérapie			X		X	X	X	X	X	X	X	
Complications (autres)			X		X	X	X	X	X	X	X	
<b>Fin de suivi</b>												<b>X</b>
<b>Nombre de rechutes en 1 an</b>												<b>X</b>

\* ME : médicament expérimental

\*\* BU : en dehors des visites à l'hôpital, le patient fera une bandelette urinaire par semaine et reportera le résultat sur un carnet patient. Si le résultat de la BU > ou = + deux jours de suite, le patient reviendra à l'hôpital pour un BP.

- Interprétation BU

BU négatif si 0 ou trace

Bu positif si > ou = + 2 jours de suite